

## **Vögel (Aves)**

### **Allgemein**

Vögel nehmen als Nützlinge in der Schädlingsbekämpfung einen wichtigen Platz ein. Nichts desto trotz können einige Vogelarten schädigend auftreten, deren einzelne Lebensweisen hier aufzuführen den Rahmen sprengen würde. Zu nennen sind hierbei: Amsel, Drossel, Star, Krähe, Eichelhäher, Hänfling u. a..

### **Schaden und Symptome**

Der Schaden durch Vögel äußert sich vor allem in angefressenen und abgepickten Früchten. Insbesondere der Hänfling neigt dazu die Nüsschen von der nach oben gerichteten Seite der reifenden Beeren zu picken.

### **Diagnose**

Besonders ab Fruchtreife sollte auf Befall geachtet werden. Die angehackten Früchte weisen häufig v-förmige Kerben auf oder sind abgerissen. Das Abpicken der Samen kann mit dem Schaden des Behaarten Erdbeersamenlaufkäfers (*Harpalus rufipes*) verwechselt werden, der jedoch im Gegensatz zum Hänfling häufiger das angrenzende Fruchtfleisch verletzt.

### **Bekämpfung**

- Erdbeerbeete mit Kunststoffnetzen überspannen
- Einsatz von Schreck-Vorrichtungen (Vogelscheuchen, Staniolstreifen etc.) begrenzt wirksam
- Einsatz von akustischen Methoden
- chemische Methoden sind grundsätzlich verboten