

Blattkäfer (*Chrysomelidae*)

Einordnung

Die Familie der Blattkäfer gehört zur Ordnung der Käfer (*Coleoptera*). An Himbeere können aus dieser Familie der Erdbeererdflöhen (*Bathophila rubi*) und der Himbeererdflöhen (*Bathophila aerata*) auftreten.

Beschreibung

Bathophila rubi: Käfer 1,5-2,0mm lang; glänzend, schwarz, Beine rot.

Bathophila aerata: 1,5-2,0mm lang; Körper schwarz, bronzegrün, glänzend; Beine rötlich.

Lebensweise

Beide Vertreter können von Ende Mai bis Ende Juni an Himbeerblättern fressend vorgefunden werden. Da sie nur geringen bis gar keinen Schaden verursachen, unterbleibt hier eine weitere Beschreibung.

Schaden und Symptome

Gelegentlich findet man sie im Mai / Juni fressend an Himbeerblättern ohne dabei jedoch Schaden anzurichten.

Diagnose

Der verursachte, leichte Blattfraß kann durch viele Schädlinge hervorgerufen werden. Ende Mai und Juni kommen auch die Vertreter der Blattkäfer in Betracht, wobei die Artbestimmung vom Fachmann durchgeführt werden sollte.

Bekämpfung

- Nicht erforderlich