

## **Brennesselblättrigkeit (Viröser Atavismus)**

### **Symptome und Schaden**

Kranke Pflanzen setzen nur wenig Beeren an. Kelch- und Blütenblätter sind schmal und spitz, Griffel und Narbe ragen aus der Blüte heraus. Das typische Symptom der Brennesselblättrigkeit der Blätter zeigt sich nur selten und dann auch nur an einzelnen Trieben. Die Randzahnung der Blätter ist gröber als normal, aber die Lappung ist deutlich verringert. Es gehen immer weniger als fünf Nebenadern von der Hauptader ab. Bei manchen Sorten zeigt sich auf den Blättern auch eine chlorotische Zeichnung. Im Sommer treten leichte Blattvergilbungen auf, und die Ränder rollen sich ein.

### **Übertragung**

Die Brennesselblättrigkeit wird durch die Johannisbeergallmilbe (*Cecidophyopsis ribis*) übertragen.

### **Diagnose**

Die Bestimmung sollte dem Fachmann überlassen werden.

### **Bekämpfung**

- Johannisbeergallmilbe bekämpfen
- Johannisbeergallmilben-resistente Sorten verwenden
- keine Neupflanzungen neben verseuchten Altanlagen
- kranke Pflanzen roden
- nur gesundes Pflanzgut verwenden